NÁVOD NA POUŽITIE

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie, ktoré by ste mali vziať do úvahy pred použitím tejto zdravotníckej pomôcky. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

hydropastilky CE 2265

jahoda

OBSAH BALENIA: 20 pastiliek

ZLOŽENIE:
1 pastilka obsahuje 4,25 % pantotenátu vápenatého, 2,60 % hyaluronátu sodného, 0,52 % karboméru a 0,29 % xantánovej gumy. Pomocné látky: sorbitol, xylitol, bezvodá kyselina citrónová, stearylfumarát sodný, arabská guma, jahodová aróma.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV:
Cieľová skupina zahŕňa dospelých a deti od 6 rokov. Produkt je vhodný pre široké spektrum užívateľov, vrátane tehotných a dojčiacich žien, diabetikov a onkologických pacientov, so suchou a podráždenou sliznicou úst a hrdla, ktoré môžu byť vyvolané rôznymi príčinami, ako nadmerné zaťažovanie hlasu, suchý vzduch spôsobený kúrením alebo klimatizáciou, alergia na peľ, fajčenie, sťažené dýchanie nosom (napr. kvôli nádche, prechladnutiu), porucha činnosti slinných žliaz, chronický postradiačný zápal na sliznici ústnej dutiny.

URČENÝ POUŽÍVATEĽ:
Určeným používateľom je pacient / laická osoba. Používanie zdravotníckej pomôcky je jednoduché a nevyžaduje školenie. Zdravotnícka pomôcka je určená na použitie v domácej starostlivosti a môže sa používať bez konzultácie s lekárom. Pre deti, ktoré nie sú schopné samostatne prečítať pokyny na použitie, je potrebná asistencia rodiča alebo inej zodpovednej osoby. Používanie zdravotníckej pomôcky u detí má prebiehať pod dohľadom.

ÚČEL URČENIA:
hydropastilky sú určené na zvlhčovanie, ochranu a podporu regenerácie sliznice úst a hrdla.

INDIKÁCIE:
hydropastilky sú indikované pre pacientov so suchou a podráždenou sliznicou úst a hrdla.

KLINICKÉ PRÍNOSY:
Podpora regenerácie sliznice úst a hrdla a zlepšenie jej zdravotného stavu, zmiernenie príznakov spojených so suchou a podráždenou sliznicou úst a hrdla ako je bolesť, škriabanie/pálenie v hrdle, zachrípnutie, dráždenie na kašeľ, sucho v hrdle a ťažkosti s prehĺtaním.

DÁVKOVANIE:
Dospelí a deti od 6 rokov môžu v prípade potreby vycmúľať každé 3-4 hodiny 1 pastilku, maximálne však 3 pastilky denne.
Neprehĺtajte pastilky vcelku, ani ich nehrýzte. Na dosiahnutie účinku sa majú nechať pomaly rozpustiť v ústach. Po ich aplikácii nejesť a nepiť minimálne 30 minút.

TEHOTENSTVO A DOJČENIE:
Nie sú k dispozícii žiadne poznatky, ktoré by bránili užívaniu prípravku počas tehotenstva a dojčenia.

KONTRAINDIKÁCIE:
Neužívajte tento prípravok v prípade precitlivenosti na niektorú z jeho zložiek. Ak trpíte neznášanlivosťou voči určitým cukrom, užívajte prípravok **hydro**pastilky len po konzultácii s lekárom alebo lekárnikom.

LIEKOVÉ INTERAKCIE:
Pri súčasnom užívaní ďalších prípravkov je potrebné dodržať časový odstup aspoň 1 hodinu.

VEDĽAJŠIE ÚČINKY:
V prípade vzniku alergickej reakcie na niektorú zo zložiek zdravotníckej pomôcky ju prestaňte užívať a kontaktujte lekárnika. Účinnosť pastiliek alebo iných liekov pri súbežnom užívaní sa môže zmeniť.

V prípade závažnej nehody spôsobenej touto zdravotníckou pomôckou ohláste túto udalosť výrobcovi a príslušnému regulačnému orgánu.

RIZIKÁ SPOJENÉ S PREDÁVKOVANÍM:
Pri nadmernom užití pastiliek sa môže vyskytnúť laxatívny účinok a/alebo žalúdočná nevoľnosť.

PREVENTÍVNE OPATRENIA A UPOZORNENIA:
Neodporúča sa používať u detí vo veku do 6 rokov. Pred použitím pastiliek u detí starších ako 6 rokov je potrebné skontrolovať skutočnú schopnosť dieťaťa cmúľať pastilku, aby sa zabránilo riziku, že pastilku celú prehltne. Necmúľajte pastilky v polohe ležmo, napr. pred spaním, kvôli hroziacemu riziku zadusenia. Pokiaľ sa príznaky zhoršia (napr. horúčka) alebo sa do 3 dní nezlepšia, navštívte svojho lekára. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prípravok neužívajte po uplynutí dátumu spotreby vyznačenom na obale. Nepoužitú zdravotnícku pomôcku vráťte do lekárne.

PODMIENKY SKLADOVANIA:
Skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste pri teplote do 25 °C, chráňte pred priamym pôsobením slnečných lúčov.

GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39 , 921 01 Piešťany, Slovenská republika

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE: 03.09.2025 _R1

VYSVETLIVKY SYMBOLOV NA OBALE:

Výrobca

Číslo šarže

Dátum spotreby

Chráňte pred slnečným žiarením.

Uchovávajte na suchom mieste.

25 °C Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Prečítajte si návod na použitie.

UDI Unikátny identifikátor pomôcky

MD Zdravotnícka pomôcka

CE 2265 Značka zhody

GENERICA®

NÁVOD K POUŽITÍ

Pečlivě si přečtěte tento návod, protože obsahuje důležité informace, které byste měli zvážit před použitím tohoto zdravotnického prostředku. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

hydropastilky CE 2265

jahoda

OBSAH BALENÍ: 20 pastilek

SLOŽENÍ:
1 pastilka obsahuje 4,25 % pantothenátu vápenatého, 2,60 % hyaluronátu sodného, 0,52 % karbomeru a 0,29 % xantanové gumy. Pomocné látky: sorbitol, xylitol, bezvodá kyselina citronová, stearylfumarát sodný, arabská guma, jahodové aroma.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ:
Cílová skupina zahrnuje dospělé a děti od 6 let. Produkt je vhodný pro široké spektrum uživatelů, včetně těhotných a kojících žen, diabetiků a onkologických pacientů, se suchou a podrážděnou sliznicí úst a hrdla, které mohou být vyvolány různými příčinami, jako nadměrné zatěžování hlasu, suchý vzduch způsobený topením nebo klimatizací, alergie na pyl, kouření, ztížené dýchání nosem (např. kvůli rýmě, nachlazení), porucha činnosti slinných žláz, chronický postradiačný zánět na sliznici ústní dutiny.

URČENÝ UŽIVATEL:
Určeným uživatelem je pacient/laická osoba. Používání zdravotnického prostředku je snadné a nevyžaduje školení. Zdravotnický prostředek je určen k použití v domácí péči a může se používat bez konzultace s lékařem. Pro děti, které nejsou schopny samostatně přečíst pokyny k použití, je nutná asistence rodiče nebo jiné odpovědné osoby. Používání zdravotnického prostředku u dětí má probíhat pod dohledem.

URČENÝ ÚČEL:
hydropastilky jsou určeny pro zvlhčování, ochranu a podporu regenerace sliznice úst a hrdla.

INDIKACE:
hydropastilky jsou indikovány pro pacienty se suchou a podrážděnou sliznicí úst a hrdla.

KLINICKÉ PŘÍNOSY:
Podpora regenerace sliznice úst a hrdla a zlepšení jejího zdravotního stavu, zmírnění příznaků spojených se suchou a podrážděnou sliznicí úst a hrdla jako je bolest, škrábání/pálení v krku, chrapot, dráždění na kašel, sucho v krku a potíže s polykáním.

DÁVKOVÁNÍ:
Dospělí a děti od 6 let mohou v případě potřeby vycumlat každé 3-4 hodiny 1 pastilku, maximálně však 3 pastilky denně.
Nepolykejte pastilky vcelku, ani je nekousejte. K dosažení účinku se mají nechat pomalu rozpustit v ústech. Po jejich aplikaci nejíst a nepít minimálně 30 minut.

TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ:
Nejsou k dispozici žádné poznatky, které by bránily užívání přípravku během těhotenství a kojení.

KONTRAINDIKACE:
Neužívejte tento přípravek v případě přecitlivělosti na některou z jeho složek. Trpíte-li nesnášenlivostí vůči určitým cukrům, užívejte přípravek **hydro**pastilky pouze po konzultaci s lékařem nebo lékárníkem.

LÉKOVÉ INTERAKCE:
Při současném užívání dalších přípravků je třeba dodržet časový odstup alespoň 1 hodinu.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY:
V případě vzniku alergické reakce na některou ze složek zdravotnického prostředku ji přestaňte užívat a kontaktujte lékárníka. Účinnost pastilek nebo jiných léků při souběžném užívání se může změnit.

V případě závažné nehody způsobené tímto zdravotnickým prostředkem ohlaste tuto událost výrobci a příslušnému regulačnímu orgánu.

RIZIKA SPOJENÁ S PŘEDÁVKOVÁNÍM:
Při nadměrném užití pastilek se může vyskytnout projímavý účinek a/nebo žaludeční nevolnost.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ:
Nedoporučuje se používat u dětí ve věku do 6 let. Před použitím pastilek u dětí starších 6 let je třeba zkontrolovat skutečnou schopnost dítěte cucat pastilku, aby se zabránilo riziku, že pastilku celou spolkne. Necumlejte pastilky v poloze ležmo, např. před spaním, kvůli hrozícímu riziku udušení. Pokud se příznaky zhorší (např. horečka) nebo se do 3 dnů nezlepší, navštivte svého lékaře. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek neužívejte po uplynutí data spotřeby vyznačeném na obalu. Nepoužitý zdravotnický prostředek vraťte do lékárny.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:
Skladujte v původním obalu na suchém místě při teplotě do 25 °C, chraňte před přímým působením slunečních paprsků.

GENERICA spol. s r.o., Vrbovská 39 , 921 01 Piešťany, Slovenská republika

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 03.09.2025 _R1

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ NA OBALU:

Výrobce	25 °C Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
LOT Číslo šarže	Přečtěte si návod k použití.
Datum spotřeby	UDI Jedinečný identifikátor prostředku
Chraňte před slunečním zářením.	MD Zdravotnický prostředek
Uchovávejte na suchém místě.	CE 2265 Značka shody

GENERICA®